16° ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHINDEMI"
Via Basilicata, 1 - 96100 Siracusa

Avviso n. 65 **Siracusa, 08/11/2021**

Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
p.c. al DSGA Valentina Barbiera

Oggetto: Pediculosi – Misure di prevenzione e profilassi

Al semplice fine di prevenire l'insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini).
Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del Ministero della sanità n° 4 del 13 marzo 1998 che riporta: "I*n caso di infestazioni da P. humanus capitis, si prevede la restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante*" **è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento**.
Si ringrazia per la collaborazione.

Misure di prevenzione e profilassi.
Il pidocchio del capo non trasmette malattie e l'unico sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell'insetto.
E' importante sottolineare che:
1. non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l'igiene personale;
2. non esistono terapie preventive ed è assolutamente inefficace e potenzialmente nocivo l'utilizzo di prodotti utilizzati per la terapia a scopo preventivo;
2. di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola.

Si fa presente il seguente protocollo di comportamento: Qualora si rilevi da parte dei genitori (o da parte dei docenti) la possibilità che i bambini siano affetti da pediculosi, la famiglia dovrà immediatamente contattare il medico curante per farsi prescrivere l'idoneo trattamento. Gli alunni interessati sospenderanno la frequenza scolastica per riprenderla soltanto dopo aver iniziato il trattamento di profilassi. Per riprendere la regolare frequenza è necessario il certificato medico.

La Dirigente
Daniela Frittitta